

## Capítulo 4

# Interpolação e Aproximação

1. Seja  $f$  uma função real de classe  $C^{n+1}$ , definida num intervalo  $[a, b]$ . Seja ainda  $p_n \in \mathcal{P}_n$  o polinómio interpolador de  $f$  em  $n + 1$  pontos distintos  $x_0, x_1, \dots, x_n$ . Para cada  $x \in [a, b]$  o erro de interpolação é dado por:

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} W(x)$$

em que  $\xi = \xi(x)$  pertence ao menor intervalo que contém todos os pontos de interpolação e  $W(x) = (x - x_0)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$ .

- (a) Mostre que a função  $f^{(n+1)}(\xi)$  pode ser prolongada como uma função contínua de  $x$ , para  $x \in [a, b]$ .
- (b) Mostre que existe uma constante  $M_{n+1}$  tal que

$$|f(x) - p_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |W(x)|$$

2. Seja  $f : [0, 1] \rightarrow \mathcal{R}$  uma função de classe  $C^4$ .

- (a) Mostre que existe um e um só polinómio  $p$ , de grau  $\leq 2$  tal que

$$p(0) = f(0); \quad p(1) = f(1); \quad \int_0^1 p(x) dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

- (b) Mostre que existe  $\xi \in ]0, 1[$  tal que  $p(\xi) = f(\xi)$ .
- (c) Utilize o resultado da alínea anterior para obter um majorante para

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - p(x)|.$$

3. Considere uma tabela de valores da função  $f(x) = \exp(x)$ , em pontos igualmente espaçados. Diga qual deve ser o valor do espaçamento  $h$ , de modo a garantir que o erro de interpolação seja em módulo inferior a  $10^{-6}$ , para todo  $x \in [0, 1]$ .
4. Sejam  $x_0, x_1, \dots, x_n$   $n + 1$  pontos distintos de  $[a, b]$ . Mostre que o polinómio interpolador de grau  $\leq n$  de uma função  $f$ , relativamente a esses pontos, pode ser representado na forma

$$p_n(x) = W(x) \sum_{k=0}^n \frac{f(x_k)}{(x - x_k)W'(x_k)}$$

onde  $W(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ . verifique também que o limite da expressão da direita quando  $x \rightarrow x_m$  é  $f(x_m)$ .

5. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$

$x_i$	-1	0	1
$f(x_i)$	5	4	8

- (a) Recorrendo à fórmula interpoladora de Lagrange, calcule um valor aproximado de  $f(1/2)$ .
- (b) Repita a alínea anterior usando a fórmula interpoladora de Newton com diferenças divididas.
- (c) Suponha que  $f(x) = 4 \exp(-x) + c_1 x + c_2 x^2$ . Determine um majorante para o erro  $|f(1/2) - p(1/2)|$ .
6. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$

$x_i$	-2	0	2
$f(x_i)$	3	6	15

- (a) Usando todos os pontos da tabela, determine uma aproximação de  $f(3)$ .
- (b) supondo que  $f$  é um polinómio de grau 3, determine os valores de  $x \in [-2, 2]$  para os quais o erro absoluto de interpolação quadrática é máximo.
- (c) admitindo que o coeficiente de  $x^3$  é 5, determine o valor exacto de  $f(3)$ , utilizando o resultado obtido em (a).
7. Na tabela seguinte são apresentados valores de uma função de classe  $C^2$  definida no intervalo  $]0, +\infty[$

$x_i$	0.8	1.0	1.6
$f(x_i)$	1.890	2.000	3.185

- (a) Obtenha o polinómio  $p_2$  que interpola  $f$  nos pontos da tabela, usando a fórmula de Lagrange.
- (b) O mesmo que na alínea anterior, mas usando a fórmula de Newton.
- (c) Calcule  $p_2(1.3)$  e, sabendo que  $f(x) - 1/x$  é um polinómio de grau não superior a 2, obtenha um majorante para o erro cometido.

8. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$ :

$x_i$	-1	1	4
$f(x_i)$	2	-2	-8

Supondo que  $f$  é um polinómio e que

$$f[-1, 1, 2] = 4, \quad f[-1, 1, 2, 4, x] = 3, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 2, 4\},$$

determine a expressão de  $f(x)$ .

9. Seja  $f$  uma função real definida em  $[a, b]$  e suponhamos conhecidos os valores  $f(x_i)$  em  $n + 1$  pontos distintos  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ . Prove que

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

10. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$

$x_i$	-1	0	1	2
$f(x_i)$	1	1	1	2

- (a) Usando a fórmula de Newton com diferenças divididas, construa o polinómio interpolador de  $f$  de grau  $\leq 3$ .
- (b) Sabendo que  $f'''(x) = 4x - 1$ , utilize a alínea anterior para determinar a expressão exacta de  $f$ .

11. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$ :

$x_i$	0.2	0.34	0.4	0.52	0.6	0.72
$f(x_i)$	0.16	0.22	0.27	0.29	0.32	0.37

- (a) Obtenha  $f(0.47)$  usando um polinómio de grau 2.  
 (b) Admitindo que  $f \in C^3[0, 1]$ , determine um majorante para o erro cometido na alínea anterior.

12. Seja  $f$  uma função definida no intervalo  $[0, 1]$  tal que a sua derivada de ordem  $m$  satisfaz

$$|f^{(m)}(x)| \leq m!, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

seja ainda  $p_n$  o polinómio interpolador de  $f$  nos pontos  $1, q, q^2, \dots, q^n$ , com  $q$  números real tal que  $0 < q < 1$ . Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(0) = f(0).$$

13. Sejam  $x_1, \dots, x_M$  valores reais distintos e  $f_1, \dots, f_M$  os valores correspondentes de uma função  $f$  nesses pontos. Prove que existe uma única função  $F_M$  da forma

$$F_M(x) = \sum_{j=1}^M c_j \exp(jx)$$

para a qual se tem  $F_M(x_i) = f_i, \quad i = 1, 2, \dots, M$ .

14. Sejam  $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$  os polinómios de Lagrange de grau  $n$ , associados aos nós  $x_0, \dots, x_n$

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

Considere a função  $g$  definida por

$$g(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) - 1$$

Prove que

- (a)  $g$  é um polinómio de grau  $\leq n$ .  
 (b)  $g(x_i) = 0, \quad i = 0, \dots, n$ .

(c)  $g(x) = 0$ , para todo o  $x$ .

**15.** O polinómio de Chebychev de grau  $n$  é definido, para  $x \in [-1, 1]$  por

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

Prove que

(a) Os polinómios de Chebychev satisfazem a relação de recorrência

$$\begin{cases} T_0(x) = 1 \\ T_1(x) = x \\ T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1 \end{cases}$$

(b) Se  $n \geq 1$  o polinómio  $T_n(x)$  tem  $n$  zeros simples no intervalo  $[-1, 1]$ , admitindo a factorização

$$T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{k=1}^n \left( x - \cos \left( \frac{2k-1}{2n} \pi \right) \right).$$

(c) No intervalo  $[-1, 1]$  os extremos de  $T_n$  são 1 e  $-1$ , atingidos alternadamente nos pontos  $t_k = \cos \frac{k\pi}{n}$ ,  $k = 0, \dots, n$ .

(d) Definam-se os polinómios

$$\bar{T}_0(x) = 1, \quad \bar{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}}$$

e seja  $\bar{\Pi}_n$  o conjunto dos polinómios mónicos de ordem  $n$  (o coeficiente do termo de maior grau é 1). demonstre que

$$\max_{x \in [-1, 1]} |\bar{T}_n(x)| \leq \max_{x \in [-1, 1]} |p_n(x)|, \quad \forall p_n \in \bar{\Pi}_n.$$

**16.** Suponhamos conhecidos os valores de  $f$  e  $f'$  nos pontos  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ . Seja  $H_{2n+1}$  o polinómio de Hermite de grau  $\leq 2n + 1$  interpolador de  $f$  e de  $f'$  nesses pontos. Prove que se  $f \in C^{2n+2}$  então, para cada  $x \in [a, b]$ ,

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \left[ \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right]^2$$

em que  $\xi = \xi(x)$  pertence ao menor intervalo que contém todos os pontos  $x_0, x_1, \dots, x_n, x$ .

17. Seja  $H_3$  o polinómio de Hermite de grau  $\leq 3$  interpolador de  $f$  e  $f'$  nos pontos  $x_0 < x_1 \in [a, b]$ . Prove que se  $f \in C[x_0, x_1]$  e  $\max_{t \in [x_0, x_1]} |f^{(4)}(t)| \leq M$ , então é válida a seguinte fórmula de majoração do erro:

$$|f(x) - H_3(x)| \leq M \frac{(x_1 - x_0)^4}{384}, \quad \forall x \in [x_0, x_1].$$

18. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$  e sua derivada

$x_i$	0	1	2
$f_i$	1	2	1
$f'_i$	1	0	-1

- (a) Determine o polinómio interpolador correspondente à tabela dada.  
 (b) Supondo que  $f$  é de classe  $C^6$ , determine um majorante para o erro  $f(x) - H_5(x)$

19. Considere a seguinte tabela de valores de uma função  $f$  e sua derivada

$x_i$	0	1	2
$f_i$	1	2	4
$f'_i$	1	-	1
$f''_i$	0	-	-

Calcule o polinómio que interpola  $f$  e as derivadas indicadas na tabela.

20. Considere a seguinte tabela com valores de uma função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$x_i$	-1	0	1	2
$f(x_i)$	1	0	1	16

- (a) Determine a melhor aproximação de  $f$ , no sentido dos mínimos quadrados, usando polinómios  $p$  de grau  $\leq 1$ .  
 (b) Idem para polinómios de grau  $\leq 2$ .  
 (c) Idem para polinómios de grau  $\leq 3$ .  
 (d) Determine em todos os casos  $d(f, p)$ .

21. Considere os pontos

$$(-5, 1), \quad (-3, 0), \quad (-1, -1), \quad (1, 2).$$

(a) Determine a função da forma

$$g(x) = \frac{a}{x-2} + bx^2$$

que melhor aproxima esses pontos no sentido dos mínimos quadrados.

(b) Determine a função da mesma forma que melhor aproxima o polinómio interpolador que passa nos mesmos pontos.

**22.** Determine qual a função da forma  $g(x) = a + cx^2$  que melhor aproxima  $f(x) = \sin(\pi x)$  no intervalo  $[0, 1]$ . Determine o erro no ponto  $x = 1$ , assim como o maior erro  $|f(x) - g(x)|$  cometido nesse intervalo.